

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|
| アスピリン末(川崎病急性期、抗炎症作用) | 30~50mg/kg/日、分3 体重15kgで750mg/日 | | | | |
| アスピリン末(抗血栓・血小板作用) | 3~5mg/kg/日、分1 最大100mg/日 | | | | |
| アスベリン syrop(5mg/ml) | 0~1才:1~4ml 1~2才:2~5ml 3~5才:3~8ml | | | | |
| アスベリンDS(2%) | 1歳未満:0.25~1g/日、1~2歳:0.5~2.25g/日、3~5歳:0.75~2g/日、分3 | | | | |
| アスベリン調剤用syrop(20mg/ml) | 0~1才:0.25~1ml 1~2才:0.5~1.2ml 3~5才:1~2ml | | | | |
| アリメジン syrop(0.5mg/ml) | ~1才:2.5~5ml、2~6才:5~10ml、7~12才:10~15ml | | | | |
| アルピニー坐薬 | 10~20mg/kg、4~6時間毎 | | | | |
| アレジオンDS(3歳以上に) | (0.025~) 0.05/kg/日、一日1回、最大2g/日 | | | | |
| アレルギン散 | 0.025g/kg/日、 | | | | |
| アレロック顆粒、DS | 2Y-6Y:1g(=2包)分2朝と眠前、7Y-:一日1回1g | | | | |
| オーグメンチン小児用顆粒 | 0.2~0.4g/kg/日、分3~分4、成人で6g~7.5g | | | | |
| オノンDS | 0.07g/kg/日分2朝夕食後 | | | | |
| オロパタジンDS1% | 2~6才:0.5g、7才~成人:1g、分2朝と眠前 | | | | |
| カロナールsyrop (20mg/ml) | 1回 0.5ml~0.75ml/kg。4~6時間以上あける。一日最大量3ml/kg。 | | | | |
| カロナール細粒 (200mg/g) | 1回 0.05g/kg~0.075g/kg。4~6時間以上あける。一日最大量0.3g/kg。 | | | | |
| クラバモックスDS | 0.15g/kg/日 分2 朝夕食直前 BW40Kgまで | | | | |
| クラリスDS | 0.1~0.15g/kg/日、分2~分3、100mg/g | | | | |
| クラリチンDS1% | 3~6才:0.5g 7才~:1g 一日1回食後 | | | | |
| ケフラールDS(10%) | 0.2~0.4g/kg/日、分3 | | | | |
| 五苓散 | ~1才:1/4量、~3才:1/3量、~7才半:1/2量、~12才:2/3量 湯でとき電子レンジ | | | | |
| コンバントリンDS | 0.1g/kg 頓用×2、1週間あけて | | | | |
| ザイザルシロップ | 6M-1Y:2.5mL一日1回、1-7Y:2.5mLを一日2回朝と就寝前 | | | | |
| サワシリン細粒(10%オレンジ) | 0.12/kg/日(分3or4)、0.02~0.04g/kg/回(3~4回/日)、中耳炎には5日間 | | | | |
| ジスロマック細粒(100mg/g) | 0.1g/kg 1日1回3日間 | | | | |
| 小児用PL | 2~4才:4.0分四、5~8才:8.0分四、9~11才:12.0分四 | | | | |
| ジルテックDS | 2Y-6Y:0.2g分2朝と眠前、7Y-15Y:一日1回 0.4g(=1包=5mg1錠) | | | | |
| シングレア細粒4mg | 1歳~5歳 一日1回 | | | | |
| セキコデS(リン酸ジヒドロコデイン2mg/ml、塩酸エトリン2mg/ml、塩化アンモニウム5mg/ml) | 3M~1才:0.9~1.5ml、1才~2才:1.8~3ml、3才~4才:2.3~3.8ml、5才~7才:3.0~5.0ml、8才~10才:4.5~7.5ml、11才~14才:5.4~9.0ml/分3各食後/日 | | | | |
| セキタールシロップ | 0.5ml/Kg/日、分2、Oxatomideオキサトミド | | | | |
| ゼスランsyrop | 0.4ml~0.8ml(喘息)/kg/日、分2 | | | | |
| ゼスラン細粒 | 0.02~0.04g(喘息)/kg/日 | | | | |
| セフspanDS | 0.06~0.12 g/kg/日、分2 | | | | |
| セフゾンDS | 0.09~0.18 g/kg/日、分3 | | | | |
| セルテクトDS(2%) | 0.05 g/kg/日、分2 | | | | |
| セlestaminS | 0.22ml/kg/日、分1~分4 | | | | |
| ダイアツブ坐薬(4、6、10mg) | 0.4~0.5mg/kg/回、2回目は8時間後に、最大1mg/kg/日、2回挿入で24hrs以上効く | | | | |
| タベジールS(フマル酸クレマスチン) | 1~2才:4ml、3~4才:5ml、5~7才:7ml、8~10才:10ml、11~14才:13ml、成人:20ml/日 分2 | | | | |
| タミフルDS(3%) | 0.133g/kg/日、最大5g/日(体重37.5kg)、分2、5日間 | | | | |
| テオドールDS(200mg/g) | 0.08g/kg/日、分2 | | | | |
| テオドールsyrop(20mg/mL) | 0.4ml/kg/日、分2 | | | | |
| テオフィリン1回投与量 | 3~4mg/Kg、8時間以上空けて(ネオフィリン:25mg/ml) | | | | |
| トランサミンsyrop(50mg/ml) | 0~1才:1.5~4ml、2~3才:3~7ml、4~6才:5~13ml、7~14才:8~20ml、15才~:15~40ml | | | | |
| ナウゼリンDS(1%) | 0.1~0.2g/kg/日、分3各食前6才以上は最大0.1g/kg/日 | | | | |
| ナウゼリン坐薬 | 乳幼児:10mg、3才以上:30mg | | | | |
| バイシリンG(40万単位/g) | 0.125g/kg/日(分2~分4)溶連菌には10日間、大人は2~4g/日 | | | | |
| バナンDS | 0.12g(分2)~0.18g(分3)/kg/日、重症0.27g/kg/日分3、最大4g | | | | |
| バルトレックス顆粒 | 水痘:0.15/kg/日分3五日 最大6g/日 帯状疱疹:成人6g分3七日 | | | | |
| フェノバル elixir(4mg/ml) | 0.75ml/kg/day | | | | |
| ブランサスS | 0.4ml/kg/日 | | | | |
| プリンペラン syrop(1mg/ml) | 0.6ml/kg/日 0.5~0.7ml/kg/日 | | | | |
| ブルフェン顆粒(20%)、錠(100 or 200) | 1回0.025g/Kg一日2回または5to7:200to300,8to10:300to400,11to15:400to600分3 | | | | |
| ベネトリン syrop(0.4mg/ml) | 0.75ml/kg/day | | | | |
| ホクナリンテープ | 0.5才~3才:0.5mg 3才~9才:1mg 9才~:2mg | | | | |
| ボララミン syrop(0.4mg/ml) | 1才:3ml、3才:5ml、7.5才:8ml | | | | |
| ボンタール散 | 0.04g/kg/日、分3 | | | | |
| マルツエキス(炭酸カリウム加麦芽糖飴) | ~6M3~6g/回、6M~1歳6~9g/回、1~3歳9~15g/回、一日2~3回 | | | | |
| ミルラクト | 哺乳時1回0.25~0.5g | | | | |
| ムコソルバン syrop | 0.3ml/kg/day | | | | |
| ムコソルバンDS | 0.06g/Kg/日、分3 | | | | |
| メブチンDS(50 μg/g) | ~5才:0.025g/kg/回を2~3回/日、6才~:0.5g/回を1~2回/日、成人:1g/回を1~2回/日 | | | | モニラック/日 |
| メブチンsyrop | ~6才:0.25ml/kg、2.3回/日 6才~:5ml/回、1.2回/日 成人:10ml/回、1.2回/日 | | | | 65%シロップ DS or bulk powder |
| モニラック(100%散、65%シロップ) | 散:0.325~1.3g/kg/日分2~3、シロップ:0.5ml~2ml/kg/日分2~3 | | | | 6M 6~12mL 3.6~7.2g |
| モニラック、ラクツロース65%シロップ | 0.5~4ml/kg/日 分3 | | | | 1歳 7.5~15mL 4.5~9g |
| ユナシンDS(100mg/g) | 0.15~0.3g/kg 分3 | | | | 3歳 10~20mL 6~12g |
| リンデロン syrop(0.1mg/ml) | 0.6~2.5ml/kg/day | | | | 12歳 30~60mL 12~24g |
| リンデロンS | 0.3~1.25ml/kgを12hr~24hr毎 | | | | |
| リン酸コデイン(100倍散=10mg/g) | 成人6g/日、1才1.5g/日、3才2g/日 | | | | |
| レフトーゼ syrop(5mg/ml) | ~2才:3~6ml、2~6才:6~8ml、7~14才:8~12ml | | | | |
| ロセフィン(ceftriaxone) | 50mg/kg | | | | |
| ロベミン小児用 | 0.04~0.08 g/kg/日、分2~分3 | | | | |
| ワイドシリン細粒(20%AMPC) | 0.1~0.2/kg/日 分3 最大量5g/日 | | | | |